

# Spikevax, Injektionsdispersion COVID-19-mRNA-Impfstoff (Nukleosid-modifiziert)


## Aufbewahrung & Handhabung

### Tiefgekühlte Lagerung

**Gefroren zwischen  
-25 °C und -15 °C lagern.**

Nicht unter -50 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren,  
um den Inhalt vor Licht zu schützen.



### Jedes Durchstechflasche vor Gebrauch auftauen

Abbildungen der Durchstechflaschen nur zu illustrativen Zwecken

**2 Stunden und 30 Minuten im Kühlschrank**


2 °C bis 8 °C  
(innerhalb der  
30-tägigen  
Haltbarkeit  
bei 2 °C bis 8 °C)



ODER

**1 Stunde bei Raumtemperatur**

15 °C bis 25 °C



Durchstechflasche vor der Verabreichung 15 Minuten  
bei Raumtemperatur stehen lassen

### Anleitung nach dem Auftauen

**Undurchstochene Durchstechflasche**

Maximale Zeiten

**30  
Tage**

Kühlschrank

2 °C bis 8 °C

**24  
Stunden**

Kühle Lagerung bis  
zu Raumtemperatur

8 °C bis 25 °C



**Nach Aufziehen der ersten Dosis**

Maximale Zeit

**19  
Stunden**

Kühlschrank oder  
Raumtemperatur

Durchstechflasche bei 2 °C bis 25 °C  
halten. Notieren Sie das Datum und  
die Uhrzeit des Verwerfens auf dem  
Etikett der Durchstechflasche.

Angebrochene Durchstechflasche  
nach 19 Stunden entsorgen.



Ziehen Sie jede Impfstoffdosis aus der Durchstechflasche für jede Injektion mittels einer neuen sterilen Nadel und Spritze auf, um die Übertragung von Krankheitserregern von Person zu Person zu vermeiden.

**Die Dosis in der Spritze muss sofort verwendet werden.**

**Nachdem die Durchstechflasche angebrochen wurde (mit Nadel durchstochen), um die erste Dosis aufzuziehen, muss der Impfstoff sofort verwendet und nach 19 Stunden entsorgt/verworfen werden.**

Nicht verwendeter Impfstoff oder Abfallmaterial ist/sind entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen.

**Impfstoff nach dem Auftauen NICHT wieder einfrieren.**

moderna®

# Spikevax, Injektionsdispersion COVID-19-mRNA-Impfstoff (Nukleosid-modifiziert)

## Dosis & Verabreichung

### Dosis und Impfschema

#### Grundimmunisierung

Personen ab 12 Jahren

Spikevax wird in zwei (2) 100-Mikrogramm-Dosen (zu je 0,5 ml) verabreicht.

Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren

Spikevax wird in zwei (2) Dosen von jeweils 50 Mikrogramm verabreicht (zu je 0,25 ml, die jeweils 50 Mikrogramm mRNA enthalten; dies entspricht der Hälfte der Grundimmunisierungsdosis für Personen ab 12 Jahren).

Es wird empfohlen, die zweite Dosis 28 Tage nach der ersten Dosis zu verabreichen.

Schwerwiegend immungeschwächte Personen ab 6 Jahren

Eine dritte Dosis kann frühestens 28 Tage nach der zweiten Dosis an stark immungeschwächte Personen ab 12 Jahren (0,5 ml, 100 Mikrogramm) und Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren (0,25 ml, 50 Mikrogramm) verabreicht werden.

#### Auffrischungsimpfung (Booster)

Personen ab 18 Jahren

Zur Auffrischungsimpfung von Erwachsenen sollte eine Dosis Spikevax (0,25 ml, 50 Mikrogramm mRNA enthaltend, was der Hälfte der während der Grundimmunisierung verabreichten Menge entspricht) mindestens 3 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung intramuskulär verabreicht werden.

Spikevax kann zur Auffrischungsimpfung von Erwachsenen, die eine Grundimmunisierung mit Spikevax, einem anderen mRNA-Impfstoff oder einem Impfstoff mit einem adenoviralen Vektor erhalten haben, verwendet werden.

### Verabreichung

Nach dem Auftauen und zwischen jeder Entnahme vorsichtig schwenken.  
Der Impfstoff ist nach dem Auftauen gebrauchsfertig. **Nichtschütteln oder verdünnen.**

#### Jede Dosis vor der Injektion visuell prüfen:

Kontrollieren, ob die Flüssigkeit sowohl in der Durchstechflasche als auch in der Spritze **weiß bis cremefarben** ist;

Kontrolle des Volumens der Spritze

Der Impfstoff kann weiße oder durchscheinende produktbezogene Partikel enthalten.

Wenn die Dosierung nicht korrekt ist oder Verfärbungen oder andere Fremdpartikel vorliegen, den Impfstoff nicht verabreichen.



Geben Sie dem Impfling oder seinem Betreuer einen Impfausweis mit dem Datum, an dem der Impfling zur **WEITEREN DOSEN** von Spikevax zurückkehren muss.

Bei Fragen besuchen Sie [www.modernacovid19global.com](http://www.modernacovid19global.com) und wählen Sie Ihr Land aus.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Spikevax wird bei Personen ab 6 Jahren zur aktiven Immunisierung zur Vorbeugung von COVID-19 verursacht durch SARS-CoV-2 angewendet.

Die Anwendung dieses Impfstoffs sollte gemäß den offiziellen Empfehlungen erfolgen.

#### GEGENANZEIGEN

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

moderna®